



Przeznaczenie:

zboża ozime i jare, kukurydza, rzepak ozimy i jary, burak cukrowy, pomidor, ogórek, dyniowate, cebula, marchew, pietruszka, por, seler, truskawka, agrest, porzeczka (czerwona, czarna, biała), borówka amerykańska, jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, śliwa, morela, brzoskwinia, ziemniak, łąki, pastwiska, soja

Warzywa

Pomidor	<ul style="list-style-type: none"> - po wytworzeniu 3 liści właściwych - po związaniu owoców na pierwszym gronie - w razie potrzeby powtórzyć zabieg po 4 tygodniach (w zależności od typu pomidora i sposobu uprawy)
Ogórek, dyniowate	<p>Z siewu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy zabieg – kiedy rośliny mają 3-4 liście - drugi zabieg – w momencie związki owoców <p>Z rozsady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabieg – po 2 tygodniach od posadzenia rozsady
Cebula	<ul style="list-style-type: none"> - pierwszy zabieg – trzecia dekada maja - drugi zabieg – połowa czerwca
Marchew, pietruszka	<ul style="list-style-type: none"> - pierwszy zabieg – w fazie 3-4 liści właściwych - drugi zabieg – 4 tygodnie później
Por	<ul style="list-style-type: none"> - pierwszy zabieg – po 5 tygodniach od posadzenia rozsady - drugi zabieg – 4 tygodnie później
Seler	<ul style="list-style-type: none"> - pierwszy zabieg – 7-10 dni po posadzeniu rozsady - drugi zabieg – 4 tygodnie później

Rośliny jagodowe

truskawka	<p>sadzone wiosną w pierwszym roku uprawy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy zabieg – 2-3 tygodnie po przyjęciu się rozsady - drugi zabieg – po 4 tygodniach, najpóźniej w lipcu <p>plantacja owocująca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy zabieg – 2 tygodnie po ruszeniu wegetacji - drugi zabieg – bezpośrednio po zbiorze owoców
agrest	<ul style="list-style-type: none"> - pierwszy zabieg – 3-4 tygodnie po ruszeniu wegetacji - drugi zabieg – bezpośrednio po zbiorze owoców
porzeczka: czerwona, czarna, biała	
borówka amerykańska	

Sady

jabłoń, grusza	<p>w pierwszym i drugim roku uprawy sadu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy zabieg – po rozwinięciu pierwszego liścia - drugi zabieg – po 4 tygodniach, najpóźniej do końca czerwca
wiśnia i czereśnia	
śliwa, morela, brzoskwinia	<p>sad owocujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pierwszy zabieg – po rozwinięciu pierwszego liścia - drugi zabieg – po kwitnieniu