



Elvita Dragon

Płynny nawóz mineralny zawierający siarkę

A large red diamond shape is centered at the bottom of the page. Inside this diamond, the number '201' is written in a large, white, bold, sans-serif font. The diamond is part of a larger geometric pattern of intersecting lines that extends across the bottom of the page.

201

Elvita Dragon

SKŁAD: zawartość siarki (S) całkowitej (obecnej w różnych postaciach)
% (m/m) — co najmniej 56,0
Postać nawozu: płynna, zawieszina
Odczyn pH (10% zawieszina): 7,5 ± 0,5
Gęstość, d 20 (g/cm³): 1,25-1,45

ZAKRES STOSOWANIA: Elvita Dragon jest nawozem mineralnym zawierającym siarkę. W zależności od uprawianego gatunku rośliny, nawóz można stosować dogłębowo i/lub dolistnie. Jest on polecany w uprawie roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Szczególnie zalecany jest do stosowania w uprawie roślin o podwyższonym zapotrzebowaniu na siarkę (np. rzepak jary i ozimy, buraki cukrowe i buraki pastewne), także na glebach słabo próchnicznych. Stosowanie nawozu polepsza wykorzystanie azotu mineralnego przez rośliny, sprzyja biosyntezie białka oraz podwyższa odporność roślin na niekorzystne warunki środowiskowe (stresy abiotyczne).

DAWKI ORAZ SPOŚÓB I TERMINY STOSOWANIA: dawki i terminy stosowania powinny opierać się na zaleceniach agronomicznych wynikających z badań gleby i/lub zapotrzebowania roślin. Stosować dogłębowo lub dolistnie za pomocą opryskiwaczy polowych i sadowniczych w formie średniokroplistych oprysków. W przypadku dogłębowego stosowania, nawóz rozprowadzać równomiernie na całą powierzchnię gleby. Opryski wykonywać w dni pochmurne, rano lub wieczorem. Nie stosować oprysków w warunkach wysokich temperatur powietrza (powyżej 25°C i przy silnym nasłonecznieniu).

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ: przed użyciem dobrze wymieszać produkt w opakowaniu. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej, dokładnie ustalić jej ilość. Odmierzoną ilość nawozu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaściu nawozu do zbiornika opryskiwacza niewypożaszonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. Przy dłuższej aplikacji lub po przerwie, ponownie wymieszać. Ciecz użytkową należy zużyć w dniu przygotowania. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

UWAGI: nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin. Nie stosować z produktami zawierającymi aminokwasy i algi morskie. Nie przekraczać zalecanych dawek. Zabrania się stosowania nawozu na glebach zamrzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem. Za glebę zamrzniętą nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia. Nie przewiduje się stosowania nawozu na użytkach zielonych

PRZECHOWYWANIE: przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Pojemniki chronić przed ogrzaniem i przegrzaniem, bezpośrednim działaniem ciepła i promieni słonecznych. W miejscu magazynowania przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami lub paszą. Nie przechowywać z silnymi utleniaczami. Temperatura przechowywania: 0°-30°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: podczas stosowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu lub ochronę twarzy. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

UPRAWA	DAWKOWANIE ORAZ LICZBA ZABIEGÓW W SEZONIE	TERMIN
RZEPAK JARY, RZEPAK OZIMY	Dawka: 3-5 l/ha Objętość wody: 200-400 l/ha Liczba zabiegów: 2-3	- I oprysk: jesienią, faza 5-8 liści - II oprysk: wiosną, po ruszeniu wegetacji - III oprysk: przed kwitnieniem
	Dawka: 2-3 l/ha Objętość wody: 200-400 l/ha Liczba zabiegów: 1-2	- I oprysk: wiosną, do końca fazy krzewienia - II oprysk: faza strzelania w źdźbło
JABŁOŃ, GRUSZA	Dawka: 4-6 l/ha Objętość wody: 500-750 l/ha Liczba zabiegów: 2-3	Opryski wykonywać w okresie od ruszenia wegetacji do fazy różowego/białego pąka w odstępach co najmniej 10 dni. Jesienią po zbiorach owoców, przynajmniej 3-4 tygodnie przed początkiem opadania liści.
TRUSKAWKA, WINOROŚL	Dawka: 2-4 l/ha Objętość wody: 400-600 l/ha Liczba zabiegów: 2-3	Opryski wykonywać w okresie od pojawienia się pierwszych liści do początku kwitnienia.
BORÓWKA WYSOKA	Dawka: 4-6 l/ha Objętość wody: 400-600 l wody Liczba zabiegów: 2-3	Opryski wykonywać od pojawienia się pierwszych liści do początku kwitnienia.
	Dawka: 20 l/ha Objętość wody: 1000 l wody	Oprysk powierzchni gleby wykonywać jesienią wzdłuż rzędów krzewów. Wykonać zabiegi nalistne: - I oprysk: w niższej dawce: w fazie 6-8 liści - II oprysk: w wyższej dawce przed zwiarcim międzyrzędzi. - III oprysk: w maksymalnej dawce w trakcie wegetacji przy wystąpieniu niedoborów siarki.
BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY	Dawka: 2-4 l/ha Objętość wody: 200-400 l/ha Liczba zabiegów: 2	Stosować dogłębowo tuż przed sianiem lub sadzeniem roślin.
	Dawka: 3-4 l/ha Objętość wody: 400-1000 l/ha	Stosować w przypadku niedoboru siarki oraz zapobiegawczo w późniejszych fazach wzrostu.

Nawóz mineralny dopuszczony do obrotu decyzją **MRIWR nr 838a/24 z dnia 18.10.2024 r.**
Data produkcji/Termin przydatności/Nr partii: na opakowaniu.

Elvita Dragon

H315 Działa drażniąco na skórę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.

P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zawartość netto:

Max:

20 l

29 kg

UWAGA

UFI: U600-Y06N-E00K-48SJ



PRODUCENT:

HERANJA INDUSTRIES LIMITED
101/102 Kanchanganga, Factory Lane, Borivli (W),
Mumbai- 400092, India (works: Plot No. 2817/1,
GIDC, Sarigam, Bhilad — 396 155, Dist. Valsad,
Gujarat, India)

IMPORTER:

LIFE BIO FARMA Sp. z o.o.
ul. Apolonka 42, 97-320 Wólbróz
www.lifebiofarma.pl



DYSTRYBUTOR:

Elvita Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 4,
87-400 Golub-Dobrzyń
www.elvita.com.pl
mail: kontakt@elvita.com.pl