Elvita
IMPULS DLA TWOICH UPRAW

Elvita Frap

WIELOSKŁADNIKOWY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY
mineralny nawóz mikroskładnikowy w roztworze

1 l

Elvita Frap

ZADEKLAROWANA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH (m/m)
MIKROSKŁADNIKI POKARMOWE SĄ CAŁKOWICIE ROZPUSZCZALNE W WODZIE:

miedź (Cu) w postaci siarczanu rozpuszczalnego w wodzie	0,5%
żelazo (Fe) w postaci siarczanu rozpuszczalnego w wodzie	2%
mangan (Mn) w postaci siarczanu rozpuszczalnego w wodzie	1%
cynk (Zn) w postaci siarczanu rozpuszczalnego w wodzie	2%

SKŁADNIKI:
woda[1] (nr CAS: 7732-18-5),
siarczan żelaza[1] (nr CAS: 7720-78-7),
siarczan cynku[1] (nr CAS: 7733-02-0),
glicyna[1] (nr CAS: 56-40-6)
[1]CMC1: Pierwotne surowce i mieszaniny

INSTRUKCJE STOSOWANIA I DAWKI:

Uprawa	Dawka w l/ha*	Termin stosowania	Uwagi – nie przekraczać zalecanych dawek
Uprawy sadownicze			
Drzewa ziarnkowe	1,5	10-14 dni przed zbiorem	O ile zbiór przedłuży się do ponad 17 dni po pierwszej aplikacji, wykonać ponowny zabieg w dawce 1 l/ha. W przypadku zbioru wielofazowego – zabiegi wykonywać bezpośrednio po poprzednim zbiorze
Drzewa pestkowe			Zabieg powtórzyć 5-7 dni przed zbiorem; 1 l/ha
Uprawy jagodowe			
Truskawki	1-1,5	3-4 dni przed pierwszym zbiorem	Zabieg powtarzać co 5-7 dni
Malina w polu	1,5	3-4 dni przed pierwszym zbiorem	Zabieg powtarzać co 5-7 dni. W przypadku bardzo wysokiej temperatury dawka powinna zostać zwiększona do 2 l/ha
Malina pod osłonami			Zabieg powtarzać co 5-7 dni
Borówka amerykańska	1	3-4 dni przed pierwszym zbiorem. Zabieg powtarzać co 5-7 dni	W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych dawkę należy zwiększyć do 1,5 l/ha
Warzywa			
Pomidor polowy -zbiór ręczny	1,5	3 dni przed pierwszym zbiorem	W razie potrzeby zabieg powtarzać co 14 dni
Brokuł letni	1,5	gdy pierwsze róże osiągną 5-6 cm	W przypadku wydłużenia zbioru powtórzyć w dawce 1 l/ha
Brokuł jesienny			W przypadku suszy i braku nawodnienia dawkę zwiększyć do 2 l/ha. W zależności od pogody zabieg powtarzać co 7-10 dni
Kalafior		gdy pierwsze róże osiągną 7 cm	W zależności od pogody i przeznaczenia plonu zabieg powtórzyć po 7-10 dniach w dawce 1 l/ha
Warzywa pod osłonami (pomidory, papryka, ogórek)	1,5	3-5 dni przed zbiorem	Zabieg powtórzyć co 7-10 dni

Nawóz przeznaczony jest do stosowania jako oprysk dolistny w okresie przedzbiorczym w uprawach warzyw, roślin jagodowych i w sadach. Stosować zgodnie z zaleceniami w tabeli. Ilość wody (min. 200 l/ha) dostosować do specyfiki uprawy.
Przed użyciem wstrząsnąć. Unikać przeprowadzania zabiegów podczas upałów i silnego nasłonecznienia. Stosować jako oprysk drobno lub średnio kropliste.
*W przypadku długo utrzymujących się wysokich temperatur zwiększyć dawkę do 3l/ha.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.
Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe zalecenia należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:
Produkt przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Temperatura przechowywania od 2°C do 40°C. Unikać przemrożenia. Chronić przed dziećmi. Ilość warstw w transporcie i przechowywaniu: max. 5.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Niebezpieczeństwo

UFI: HD10-00C3-G00X-E9XF

PRODUKT ZAWIERA:
siarczan(VI) manganu(II) (nr indeksowy: 025-003-00-4), siarczan(VI) cynku(II) (uwodniony) (monohydrat, heksahydrat, heptahydrat) (nr indeksowy: 030-006-00-9)

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Unikać uwolnienia do środowiska.
Stosować odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
Zebrać wyciek.
Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

INFORMACJE OGÓLNE:
Przedzbiorcze zaopatrzenie roślin w składniki dostarczone przez Elvita Frap skutkuje spowolnieniem procesów przejrzewania owoców i warzyw, wydłużeniem optymalnego okresu zbioru, ograniczeniem opadania owoców oraz niepożądanego zakwitania warzyw. Wpływa także na lepszą jakość owoców i warzyw oraz zwiększa ich trwałość w transporcie i w obrocie handlowym.

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
Podane zalecenia i informacje są wynikiem obszernych badań. Wiele czynników, na które producent/dystrybutor nie ma wpływu (takie jak np. przygotowanie cieczy użytkowej, aplikacja, warunki pogodowe itp.), może mieć wpływ na właściwe użycie produktu. Użytkownik odpowiada za skutki związane z nieprzestrzeganiem zaleceń zawartych na tej etykiecie w całości bądź w części.

Data produkcji, numer partii: na opakowaniu

Elvita
Redystrybutor:
Elvita Sp. z o.o.
Dworcowa 4,
87-400 Golub-Dobrzyń
www.elvita.com.pl
mail: kontakt@elvita.com.pl

Przepakowane przez/Dystrybutor:
Bioagris Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Lubawska 4a, 03-011 Warszawa
Tel.: +48 793 797 757
mail: info@bioagris.pl

Producent:
ECOCULTURE BIOSCIENCES S.L.
Rambla Obispo Orberá, 11 - 1º 4
04001 Almería, Hiszpania
Tel.: +34 950 264 981
mail: info@ecoculturebs.com;

CE

Objętość netto: 1 l